

卷十九

吉慶堂



兩腋

胎前門下

傷食

大全曰結云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生者精血也
五志傷白五味若雜子飲食不節生於毒物過性食喉致傷胃
故婦傷食最難得藥性本香凡白米飯二方最穩健

薛氏曰以血先生云脾胃之氣壯則易化而食不難食而不動
胃主司脾胃之消化五臟之本以胃氣為本胃氣旺則
化也若投以峻劑則脾胃氣傷而化不復矣

濟陰綱目卷之九

關中 武之望 却卿父頓著 武林 張文嘉 仲嘉父訂正

西陵 汪 淇 愔 適子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

胎前門下

傷食

大全目經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生於毒物恣性食啖致傷脾胃故娠傷食最難得藥惟木香丸白朮散二方最穩捷

薛氏曰東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑多食而不傷益胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不化也若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所因而調治

之。若飲食停滯。或肚腹作痛。用平胃散。腹滿泄瀉。用六君子湯。若脾氣下陷。用補中益氣湯。凡嘔覺藥氣。且戒藥餌。節飲食。經云。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。大凡脾胃虛弱。飲食難化。以白朮。陳皮。爲末。等分。陳麴糊丸。常服最善。枳朮丸。但可暫用。似實。暖。厲能耗真氣。治者慎之。

一妊婦因停食。服枳朮丸。胸腹不利。飲食益少。更服消導寬胸之劑。其胎下墜。余謂此脾氣虛而不能承載也。用補中益氣。及六君子湯。中氣漸健。其胎漸安。又用八珍湯。加柴胡。升麻。調理而痊。

平胃散。治妊娠飲食停滯。或肚腹作痛。

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

薑製

陳皮

錢各一分

甘草

炙五分

右劉加生薑三片。棗一枚。水煎服。

嘔吐惡心加枳殼砂仁。

吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分。

大君子湯。治脾胃虛弱飲食難化或腹滿泄瀉。

人參 白朮 茯苓 甘草炙 半夏 陳皮各一錢

右剉加生薑三片棗一枚水煎服。

停滯肉食加山楂。

停滯麪食倍加麥蘖。

停滯糯米食用白酒麴一味。

停滯米飲倍加穀蘖。

魚腥所傷倍加陳皮。

傷辛熱之物加黃連。

三稜犯胎忌
與人參並用
或無妨亦須
看人強弱

佐紫蘇白芷
調和胃氣妙

俗謂殺胎癭
即此

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應
用四神丸

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香 二錢 三稜 人參 白茯苓 各三錢

右為末麴糊丸如蠶豆大每服三四十丸熟水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一兩 人參 白芷 炒 各七錢半

川芎 訶子皮 青皮 各半兩 甘草 炒 二錢半

右可服二錢加生薑三片水煎服

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之
氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而為精神之主若血氣

不和則精神衰弱故邪毒之氣得得以中其胎也

溫行惡氣

不和則精神衰弱。故邪毒之氣得以中之。妊娠病此亦致損胎也。
薛氏曰：前證當調補正氣為善。用金銀藤一味煎湯飲之。
當歸散 治妊娠中惡心腹病痛。

當歸

丁香

川芎

各三兩

青橘皮

吳茱萸

半兩去梗湯泡三次炒黑

右為細末溫酒調下一錢無時

又方

生乾地黄

二兩

枳殼

木香

各七錢半

右為細末每服一錢酒調下

又方

苦梗

一兩細剉畧炒

生薑

半兩

水煎服之

散滯湯 治觸惡冒氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮

三錢

黃芩

芍藥

各二錢

歸尾

一錢半

川芎一錢

木香五分

甘草炙少許

右分二貼水三盞先煮葶根兩大片至二盞去葶根入前藥同

煎至一盞熱服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水嚥之吐出即安

一方用龍心土為末每二錢并水調服白湯亦可

傷寒

吳氏曰凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎為主凡藥中有犯胎者則不可用也如藿香正氣散十味芎蘇散參蘇飲小柴胡湯

此真中惡也
煮方極妙

汗下和法
固成法也而

之類有半夏能犯胎如用須去之若痰多嘔逆必用之以半夏麴
則可如無沸湯炮七次去皮臍生薑自然汁拌曬乾乃可用也人
川烏附子天雄側子肉花乾薑大黃芒硝葶花甘遂大戟蜀漆水
蛭蠪蟪桃仁牡丹皮乾漆代赭石羅麥牛膝等類之物皆動胎之
藥凡用必須斟酌仔細詳之大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩
白朮二味能安胎也或與此二味煎湯與之或為細末白湯調下
二三錢亦佳如妊娠素稟弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如
用小柴胡去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也其効
如神餘皆倣此用之則妙矣

萬密齋云妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五
臟表裏所見脈證主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主半

主以香薷
龍三黃解
三方則發
人所未發
妙甚

表半裏則和解之以黃連湯為主在裏則下之以三黃解毒湯為主此吾家傳之秘法入甚多如古方六合湯雖分治詳明猶不及此切常古方六合湯自表虛四物湯至四物大黃湯共計十五方詳見第一卷訓經門四物湯加減條下白朮散治傷寒熱病先以此安胎但覺頭痛發熱便可服二三服即瘥若四肢厥逆陰證也不可用

白朮

黃芩

各等分新瓦土炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

安胎阿膠散

治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

各等分

右為末每服一錢川糯米飲調下日三服

香蘇散

凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之

先服安胎
是入頭胎
表可重有須
斟酌

香蘇散
香附炒黑

紫蘇各二錢

陳皮一錢

甘草五分

右劉加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢各青芷香蘇散

假令得肝脈其外證善怒其三部脈俱浮而眩惡寒

裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽

受病也

假令得心脈其外證而赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裏

和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脈面黃善噦善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加

白朮防己各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏善悲不樂欲哭其尺寸脈俱浮

附子雖云犯胎然中附子湯亦治胎寒但須其寒方可酌用

面瀉惡寒裏和本方加黃芪防風各一錢謂肺土燥是大腸受病也

假令得腎脉其外證面黃善恐其尺寸脉俱浮而瀉惡寒裏和本方加附子炮一錢謂腎主寒是膀胱經受病也附子犯胎禁也用吳茱萸湯之

羌活湯河間云解利傷寒不問何經所受雖不能盡解亦無壞證无益姪婦

羌活二錢 白朮一錢 防風 川芎

白芷 黃芩 甘草各一錢 細辛三分

右剉水煎服無時如無汗去白朮用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯 姪婦傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲

有汗

貴龍湯即小柴胡或生夏為少陽經藥而此自重在和解故主之其加減法更妙

小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡一錢 黃芩一錢 人參 甘草各錢

右加薑棗水煎服

加寒熱往來無汗口乾加葛根二錢去棗八慈白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢去棗加慈白三根

如發熱有汗口渴加白朮桂枝各一錢半

如脈浮大有力大熱大渴本方人參白虎湯去薑棗

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢去棗

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各二錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利為度

三黃解毒湯。姪媛傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼惡寒之證止煩躁發熱大渴小便赤大便秘或利下赤水六脈沉實此症邪在裏也宜此方主之。

黃芩

黃連

黃蘗

山梔

大黃

各等分

右剉水煎服。與隨五臟脈證加減。

假令得肝脈其內證煩滿消渴便難尺寸脈沉弦有力是肝

經本臟受病也。本方加當歸一錢半甘草五分。陪山梔。

假令得心脈其內證煩躁心痛掌中熱而噦尺寸脈沉數有力

是心經本臟受病也。本方加麥門冬一錢竹茹一團倍黃連。

假令得脾脈其內證腹脹滿譫妄其脈沉緩有力是脾經本臟

受病也。本方加枳實炒厚木黃芩炒各一錢半倍大黃。

既寒逆矣又
主三黃雖加
乾姜忍終未
受酌之

傷風自汗如
頭疼邪盛者
此方用常斟
酌

桂能墮胎宜
火焙用

假令得肺脈其內診喘咳腦滿尺寸脈沉濇有力是肺經本臟
受病也本方加葶藶炒一錢枯梗五分倍黃連

假令得腎脈其下重足脛寒而逆尺寸脈沉而石是腎經本
臟受病也加乾薑炮五分熟地黄一錢半倍黃蘗

黃芪解肌湯 治妊娠傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎 甘草各半兩 芍藥六錢

右咬咀每服八錢水煎服加蒼朮生地黄亦可

桂枝芍藥當歸湯 治婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜此

方

桂枝 芍藥 當歸各一兩

右剉細每服一兩水煎服

裏虛宜

芍藥湯

治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰病也宜此方

芍藥

白朮

茯苓

甘草
各一兩

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯

治妊婦傷寒發汗後汗漏不止胎氣損者

當歸身

黃耆多

生薑黃

黃芩

白芷

阿膠珠

炙甘草
各等分

右用浮小麥一握

煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服

加味黃芩湯

治妊婦傷寒下後協熱而利不止胎氣損者

黃芩

二錢

白芍藥

白朮

白茯苓

炙甘草

阿膠
各一

先煎法妙

此竹葉石膏湯變法也。以阿膠生地易知母石膏妙甚。

右用水一盞半煎一盞後入阿膠再煎八分服。

加味竹葉湯。妊婦汗下後熱不除者。虛也。此方生之。

人參 麥門冬 炙甘草 阿膠 生地黃各一錢

右加竹葉十二片粳米一合煎服。

黃龍四物湯。治妊婦傷寒產後發熱者。宜此方。

柴胡二錢 黃芩一錢半 人參 甘草

當歸 川芎 芍藥 地黃各一錢

右劉水煎服。若因於食者。本方加枳實。

加減四物湯。治妊婦傷寒熱發斑狀如錦紋者。

當歸 白芍藥 生地黃 黃芩各等分

右劉水煎服。八錢水煎服。

齊合圖目 卷之七 傷寒

梔子大青湯。治妊婦傷寒發斑變為黑色。

升麻

黃芩

梔子各二兩

大青

杏仁各半兩

右咬咀每服五錢。水一盞半細切葱白三寸煎服。

一方。治妊婦傷寒發斑忽黑小便加血胎欲落。

梔子

升麻各四兩

黃芩

生地黃根二十兩

石膏

八兩

葱白切一升

黃芩

三兩

右用水煎分三服忌熱物。○又以井中泥塗心下乾則易。

護胎法。

治傷寒熱病護胎。

用白藥子不拘多少為末以雞蛋清調攤於紙上如碗大貼。

臍下胎存處乾則以濕水潤之。

護胎法。

治孕婦一切有熱內外諸證。

護胎法妙。

伏龍肝爲末用井底泥調敷心下令胎不傷

中風

風者百病之
長中之則隨
所挾而現病
此語簡明詳
妙妙

大全論曰夫四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其
鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名爲虛邪賊害萬物人體虎
則中之若風邪客於皮膚入於經絡卽頑痺不仁若入於筋脈挾
寒則癱急喎僻挾濕則弛縱癱軟若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟
俞皆在背臟腑虛寒邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而爲諸病
姪娠中風若不早治則令墮胎也

薛氏曰按機要云風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血
也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗
下之戒而有中風中腑之分中腑者多著四肢則脈浮惡寒拘急

不仁中臟者多者九竅則辰緩失音耳聾鼻塞目瞽傾邪中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中風之要法也

防風散 治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強

防風 去苦 葛根 桑寄生 各一兩 羚羊角屑 細辛 去苗 當歸

甘菊花 漢防已 去皮 桂心 扶神 去苗 甘草 炙各半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至一大盞去滓入竹

瀝半合攪勻溫服無時

主犀角散 治妊娠卒中風不語四肢強直心神憺憺

生犀角屑 麻黃 去節各一兩 防風 去苦 赤箭 羌活 當歸

人參 各去 葛根 赤芍藥 各七錢半 秦朮 甘草 炙各半兩 石膏 一兩

惟宜中風而有風邪無汗者宜之

右咬咀每八錢煎服法如前

防已散 治雄娠中風口眼喎斜手足頑痺

防已去皮 羌活 防風各去蘊 麻黃去節 松木節

羚羊角屑各一兩 桂心 荊芥穗 薏苡仁 桑寄生

甘草炙各一兩

右咬咀每服五錢至薑五片水煎溫服不拘時

白殭蚕散 治雄娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不得四肢強

直

白殭蚕炒 天麻 獨活去蘊各一兩 麻黃去節 烏犀角屑七錢半

白附子炮 半夏湯洗七次薑製 天南星炮 藿香各兩 龍腦二錢半另研

右為細末入研藥合勻每服一錢生薑薄荷湯調下不拘時日

三服

赤箭丸

治姙娠中風手足不隨筋脈緩急言語蹇澁皮膚不仁

赤箭

草薺

酒浸

麻黃去筋

獨活

去

鼠鬚子

熟乾地黄

熟羊角

屑各一兩

阿膠

炒

防風

去

芎藭

當歸

薏苡仁

五加皮

秦艽

去

漢防已

去皮

柏子仁

酸棗仁

炒

丹參

去芦各七錢半

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如桐子大每服三十丸豆淋

酒送下食前服

白朮酒

治姙娠中風口噤語言不得

白朮

一兩半

獨活

一兩

黑豆

一合炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者拘口灌

此方不特姙婦可服

之得汗即愈

治妊娠因感外風如中風狀不省人事

熟艾三兩陳米醋炒令極熟以綿帛裹熨臍下良久即省

風瘕即子癰

大全云妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤背強名之曰瘕又云瘕其候冒悶不識人須臾自醒良久復作謂之風瘕一名子癰一名子冒甚則反張

薛氏曰前證若心肝風熱用鉤藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱鉤藤散脾鬱痰滯二陳薑汁竹瀝若兼證相雜當參照子煩門

丹溪治一婦人懷妊六月發癰手足揚直面紫黑色合眼涎出昏

此方中藥中風俱妙

以防風通聖散
散者紅花
治者為藥
為藥而飲
酒而飲
為藥而飲
為藥而飲
藥之妙

惜不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾時作時止無
減證直至臨產方自愈產一女葳中子母皆安次年其夫疑丹毒
必作求治之診其脈浮取弦重取滿按至骨則沉實帶數時正二
月因未見其癰發正狀未敢與藥意其舊年癰發時乃五月欲待
其時度此疾必作當審證施治至五月半其疾果作皆是午巳兩
時遂教以白製防風通聖散用甘草加桃仁多紅花少或服或嘔
至四五十劑疾漸蹶而輕後發為疥而愈

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子癇風瘕

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮 薏苡仁 防風

當歸 酒浸 川芎 茯神 杏仁 木香 甘草

右咬咀加生薑五片水煎服

葛根湯。療妊娠臨月。因發風痙。忽悶憤不識人。吐逆眩倒。少醒復發。名曰子痙。

葛根

貝母性

牡丹皮

防風

防己

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草

各二兩

石膏

碎

獨活

人參

各三兩

升麻代貝母
不妥

右咬目每服八錢水煎服。○貝母令人易產。若未臨月者。以升麻代之。忌海藻。菹菜。酢物。○此方犯桂與牡丹。不如羚羊角散之安。

葛根湯

治子痙。兼用產後逐惡血下胞衣。

川芎

羌活

各等分

剉水煎。入酒少許溫服。

以風為主

此方甚佳可
通雜症

羌活酒 治姪媛中風瘓口噤四肢強直角弓反張

羌活

去苦一兩半

防風

去苦一兩

黑豆

去皮一合

右前二味咬咀好酒五斤浸一宿毋服用黑豆一合炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分兩服灌之

○瘓瘓

此風皆本於
熱故立方亦
皆從氏

薛氏曰瘓者筋脈急而縮也瘓者筋脈緩而伸也一縮一伸手足相引搖撼不已與前兒發搐相似謂之瘓瘓也此證多屬風益風主搖動也駱龍舌云心主脈肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則為瘓瘓也治法若因風熱用鉤藤湯加柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風痰上涌加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蝎僵蠶並指氣血用八珍湯加鉤藤山梔為

主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝絕也皆不治一婦四肢不能伸服祛風燥血之劑遺尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒罌粟為主佐以鉤藤湯而安後因怒前證復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鉤藤散加山梔柴胡而血止用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鉤藤散飲食進而漸安

鉤藤湯

方見胎動不安

子瘡

大全云孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也

足亦腎氣之名

岐黃帝問曰人有重身九月而瘖也為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

○欬嗽

大全云夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於腑妊娠嗽久不已則傷胎也

薛氏曰前證若

秋風

傷肺用金沸草散

雜欬

夏間火邪尅金

用人參平肺散

雜喘

冬間寒邪傷肺用人參敗毒散

雜傷

春間風邪

傷肺用參蘇飲

雜發熱

若脾肺氣虛用六君芎歸桔梗若血虛四物

加桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣

虛風寒所傷用補中益氣湯桑皮杏仁桔梗益肺屬辛金生於巳
土嗽久不愈者多曰脾土虛而不能生肺氣以致腠理不密外邪
復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金
生腎水爲善

一姪娠嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益
氣湯以培土金六味丸加五味以生腎水而愈

一姪婦嗽嗽其痰上湧曰五六碗許諸藥不應予以爲此水泥爲
痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一姪婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加
山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子
加升麻柴胡而愈

桔梗散。治妊娠肺壅。咳嗽喘急不食。

天門冬去心 赤茯苓各錢 桑白皮 桔梗 紫蘇各五分

麻黃去節 貝母 人參 甘草各二分 一方有杏仁無貝母

右劉加生薑水煎服。

馬兜鈴散。治妊娠氣逆寒咳嗽氣喘。

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母各五分

桑白皮 陳皮去白 大腹黑豆水 紫蘇各一錢 五味子二分

一方有枳殼無人參貝母桑白皮三味

右劉一服加生薑三片水煎服。

百合散。治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿。

百合蒸 紫苑洗 貝母去心 白芍藥 前胡

風壅咳嗽而用百合白芍恐用所宜久服者方可

赤茯苓 桔梗炒各一錢 甘草炙五分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾溫服。

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎動不安。

紫苑 天門冬去心各一兩 桔梗半兩 杏仁

桑白皮 甘草名一錢半 一方有防風五分

加蜜法妙。

右以咀每服三錢加竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎二沸溫服。

喘急

診法妙絕。

呂滄洲治經歷哈散待人病喘不得臥眾作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛於人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病益得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作

齊雲岡目

卷七 欬嗽

十五

喘也。乃用催生湯加芎歸。三升服之。夜半果下一死胎。喘即止。哈散密囑曰。病妾誠有懷以室人。見嫉故藥去之。眾所不知也。眾慚而去。

平安散。治妊娠上氣喘急。大便不通。嘔吐不食。腹脇脹痛。

川芎

木香

各一錢半

陳皮

熟地黃

洗

乾薑

炮

生薑

厚朴

製炒

甘草

各一錢

右作一服。水二鍾。入燒鹽一捻。煎至一鍾。不拘時服。

桔梗湯

馬兜鈴散

並見前
咳嗽條

○吐血。衄血。咳唾血。

大全云。妊娠吐血者。皆由臟腑有傷。凡憂怒驚怒。皆傷臟腑。氣逆於上。血隨而溢。心悶胸滿。久而不已。心悶甚者死。妊娠病此多。宜

桂枝湯。或明證。若肝經怒。人先用小柴胡。如山。胎生。則次用芍藥。合

胎也。

薛氏曰：前證若肝經怒火，先用小柴胡，加山梔、生地，次用芍藥、合四物，後用加味逍遙散。肝經風熱，防風、子芩、九心、經有熱、朱砂、安神丸、心氣不足、補心湯、魚鱗、傷心妙香散、胃經有火、犀角、地黃湯、膏梁、積熱、加味清胃散、鬱結傷脾、加味歸脾湯、肺經有火、黃芩、清肺飲。

河澗生地黃散。治吐血、衄血、咯血、溺血、下血，諸見血無寒皆屬於熱，但血家證皆宜服此藥。

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芪 白芍藥 黃芩 甘草 各等分

右咬咀，每服一兩水煎服。如脈微身涼惡風，每兩加桂半錢。

黃芪補氣，枸杞助陽，以於血症常斟酌然諸藥同用則又助氣益血耳。

此方有參
指歸為益
症新起奇
聖試

婦患此恐
傷其胎豈
此方

○如下血加地榆。

局方必勝散。

治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血。

熟乾地黄

小蓟并根

人參

蒲黃微炒

當歸去苦

茜莢

烏梅肉各兩

右件搗羅為散。每服五錢。水煎溫服。

○瘧疾。

大全云。姪媛病瘧。乃夏傷於暑。客於皮膚。至秋而發。陽盛則熱。陰

盛則寒。陰陽相勝。寒熱作止。發者。由風邪客於風府。循臂而下。

衛氣至。一日一夜。常大會於風府。故發日。晏其發。早者。衛氣之行。

風府曰。下一節。二十一日。下至尾。二十一。八脊內。上注于伏。

衝之脈。其行九日。出缺盆。其氣既上。故發更早。其間日發者。風邪。

內搏五臟橫通募原其道遠其氣深其行遲不能因作也。姪媛而發多傷於肺。

薛氏曰前證丙脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸脾湯若木侮土久而不愈用六君子爲主佐以安胎藥仍參三陰三陽經而治之。七寶散治男婦一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日發或間日發或三四日一發不問塊瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之。

常山

厚朴黃製

青皮

陳皮不去白
一云去白

甘草抄

枳櫚

草果去殼各
等分

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎至一大盞云
滓露一宿再用水酒煎滓亦露一宿來日當發之早盪溫面東
先服頭藥少頃再服藥道大有神効

渠繩曰嘗治一姪婦六七個月患瘧先寒後熱六脈浮緊醫用
柴胡桂枝無効予曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃
從子治以七寶散一服瘧苗帝問曰婦人重身毒之奈何岐伯
曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大
生而止誠審藥物之性明治瘵之方何疑攻治哉

人參養胃湯

治姪娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身

痛面色青白脉弦遲者驅邪散治證亦同。

半夏 厚朴製 橘紅名八分 蒼朮一錢 藿香葉

草果 茯苓 人參各五分 甘草灸三分

右加生薑七片烏梅一個水煎服。

清脾湯。治妊娠瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便秘

澀不進飲食脉弦數者。

青皮 厚朴薑製 白朮以 草果 茯苓

半夏 黃芩 柴胡 甘草炙各五分

右加生薑水煎服。

驅邪散。治妊娠停食感冷發為瘧疾。

高良薑炒 白朮 草果仁 橘紅

此大柴胡湯
法也惟外邪
未解而內熱
寒甚者宜之
然須酌用

此外傷暑而
內有痰熱多
煩渴者宜之

若果內熱之
極必須用藥
以清之

藿香葉

縮砂仁

白茯苓

各一錢半

甘草

炙五分

右以咀作一服加生薑五片竈一校水煎服

柴胡散。治妊娠瘧疾。

柴胡

二錢

生大黃

二錢

生黃芩

一錢五分

甘草

二錢

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度

又方

常山

石膏各一兩

黃芩

甘草

炙各半兩

烏梅

七個

右細切以水酒各一碗浸一宿平旦煎至一碗去滓分二服臨

發時服

右二方犯常山大黃吐下之劑若六脉浮緊有力中有頑痰積

熱者用之所謂有故無殞也其他療治方法已備雜證瘧門若

熱甚恐致動胎者亦如傷寒熱痢治方以白藥子伏龍用等全

臍上下可也。

○霍亂。

論霍亂雖明
雜症亦不外
此。

大全云。飲食過度。觸冒風冷。陰陽不和。清濁相干。謂之霍亂。其間或先吐。或腹痛吐利。是因於熱也。若頭痛體疼發熱。是挾風邪也。若風折皮膚。則氣不宜通。而風熱上衝。為頭痛。若風入腸胃。則泄利嘔吐。甚則手足逆冷。此陽氣暴竭。謂之四逆。妊娠患之多。致傷胎也。

薛氏曰。前證若因內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。若因飲食停滯。用平胃散。若果脾胃頓傷。陽氣虛寒。手足逆冷者。須用溫補之劑。治當詳審。毋使動胎也。

萬密齋曰。霍亂者。陽明胃經之病名也。蓋因平日五味肥醲腐積。

成痰七清鬱結氣盛為火停蓄胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利並作揮霍變亂故名霍亂如邪在上胃腕則當心而痛其吐多邪在下胃腕則當臍而痛其利多邪在中腕其腹中痛吐利俱多吐多則傷氣利多則傷血血氣受傷不能護養其胎况邪氣鼓擊胎元母壽未有不殞者矣此危惡之證不可不亟治也宜香蘇散加藿香葉主之

此方平正可法

香附

炒

紫蘇

各二錢

陳皮

一錢

甘草

炙

藿香葉

縮砂

各五分

右剉水煎服○如轉筋加木瓜一錢○胎動不安加白朮一錢半○如夏月得之加黃芩一錢半黃連一錢香薷二錢○如冬月得之加入麥白朮各一錢乾姜炮五分

此方甚良

回生散

治中氣不和霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮

去白

藿香

各五分

右為末

水煎溫服

七味白朮散

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

人參

茯苓

甘草

炙

木香

藿香

各半兩

乾薑

一兩

右為末

沸湯調服二錢吐甚者加生薑汁頻服之

理中湯

治妊娠霍亂腹痛四肢逆冷汗出脈虛弱者

白朮

人參

乾薑

炮

甘草

各一錢

右剉水煎服

○甚者加熟附子五分

人參散

治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

心煩腹痛而
用人參煎湯
豈煩非熱而
有虛虛乎虛
寒熱用者
須斟酌之

此魚肝其腹
痛吐利方也
勿妄用

此方可當用

霍亂切忌溫
藥犯者必死

人參

厚朴薑製切各

橘紅各二錢

當歸炒

乾薑炮

甘草炙各一錢

右作一服加生薑三片棗一枚水煎服

白朮散治姙娠霍亂腹痛吐利不止

白朮

益智仁

枳殼炒

橘紅各七錢半

草豆蔻煨去皮良薑炒各半兩

右為散每服五錢入生薑半分水煎去滓溫服

木瓜煎治姙娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸湯洗七次

生薑切各七錢半

木瓜竹刀切一兩半

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服一方有鹽豉

七錢甘草一錢柴胡半兩加紫蘇煎右四方用乾薑草蔻柴胡俱大

即不發熱煩渴者亦不可經用燥之慎之

溫之劑若發熱煩渴數陽證者服之即死宜用後方

竹茹湯嘔吐益元散桂苓甘露飲冬葵子湯並治霍亂

○泄瀉

大全云姪娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之嘔腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷洞泄用理中湯治中湯伏暑煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利用不換金正氣散胃苓湯此四證之大略也

薛氏曰泄瀉若米食所傷用六君加穀蘗麩食所傷用六君加麥

藥肉食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六
君加柴胡生薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂
不應。用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益
氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不
食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更侵晨
飲食少思乃脾胃虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或
愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土爲善
進土王徵之內懷泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強
進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強候脾胃醒消滿自化飲食自
進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰
若然則胃氣益傷也經云損其脾者謂其飲食適其寒溫後不寒

果愈。

胃苓湯。治脾濕太過。胃氣不和。腹痛泄瀉。水穀不化。陰陽不分。

此平胃散與五苓散合方也。

蒼朮

厚朴

陳皮

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉各一錢
官桂

甘草各五分

右加生薑三片。棗三枚。水煎食遠服。

不換金正氣散。

治妊婦傷濕泄瀉。

蒼朮

厚朴

陳皮

藿香

半夏

各一錢

甘草

五分

右加薑棗煎服。

胃風湯。

治風冷乘虛入客。腸胃米穀不下。泄瀉注下。及腸胃濕。

毒下如豆汁。或下瘀血。或下魚腦。日夜無度。

此方治湯久
氣血兩虛
妙然肉桂升
久虛脈急者
斷不可用其
曰胃風取其
益胃而升舉
也

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

芍藥

肉桂

各等分

右剉每服八錢。八粟米一撮。水煎服。○如腹痛加木香。

加味理中湯。治妊娠泄瀉。

人參

白朮

白芍藥

白茯苓

乾薑

黃連

木香

霍香藥

訶子肉

肉豆蔻

甘草

各一錢

右剉水二鍾。生薑三片。大棗二枚。煎一鍾。飢時服。

加味治中湯。治飲食過多。脾胃之氣不足以運化而瀉。

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

各一錢

陳皮

去白

青皮

各七

砂仁

五分

錢氏五黃散。治妊娠泄瀉。嘔吐腹痛。手足厥逆。

陳皮

青皮

訶子肉

各五錢

丁香

二錢

甘草

錢

右爲末每服三錢水煎服

草果散

治臟腑虛寒腹痛泄瀉無度

厚朴

薑汁拌炒三兩

肉豆蔻

十個煨

草豆蔻

十個煨

右每服三錢加生薑煎服

痢疾

大全云。妊娠飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢也。

薛氏曰。治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損真氣下陷也。當升補中氣若黃而兼青乃肝木尅脾土宜平肝補脾若黃而兼

車隆起於久
病敢為下元
氣虛而以補
中六君治之
若非久病者
猶可以安胎
為至也

白乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾
胃若黃而兼赤乃心母益子但用補中益氣若腸胃虛弱風邪客
之用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之藥當
病制宜不必拘用阿膠艾葉之類

地官胡成甫之內姪娠久病自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣
不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹重墜下元氣虛也胎動不
安內熱盛也遂用補中益氣湯而安又用六君子湯全愈

壺仙翁治湯總兵夫人姪娠病痢不止翁診其脈虛而滑兩關若
滴此山胎氣不和相火炎上而有熱似痢症非痢也乃用黃芩白
朮以安胎四物生地黃以調血數劑而安

白朮湯
名三
治孕婦下痢膿血

白朮

黃芩

當歸各等分

右吹咀每服三錢至四錢水二盞煎至一盞去渣溫服日夜三
次○嗽者加桑白皮食後服之

當歸芍藥湯 治妊娠腹中疴痛下痢赤白

白芍藥

白茯苓

當歸

川芎

澤瀉各五錢

白朮七分半

右爲細末溫酒或米飲任意調服○一方無川芎有條芩甘草

黃連木香檳榔吹咀煎服

黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連八分

厚朴製

阿膠

當歸

乾薑各六分

黃芩

艾葉各四分

右為細末空心米飲調下方寸七口三服

蒙薑黃連丸 治妊娠下痢赤白穀道腫痛冷熱皆可服

乾薑炮 黃連 縮砂仁炮 川芎

阿膠蛤粉炒 白朮各一兩 乳香二錢另研 枳殼去白麩炒半兩

右為末用烏梅三個取肉入少醋糊同杵丸如桐子大每服四

十丸白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下

一方有木香二錢

三黃熟艾湯 治妊娠挾熱下痢

黃連 黃芩 黃蘗 熟艾各等分

右剉每服五錢水煎服○嘔加橘皮生薑

歸耆湯 治妊娠下痢腹痛小便澀滯

以三黃湯加熟艾治熱痢加橘皮生薑治嘔俱

黃芩

當歸炮各一兩

糯米一石

右細切分四服水煎服

大宜散。治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死。

黑豆

粒二十

甘草

二錢半生炙各半

栗殼

二個去頂半生半炒

右為麤末作一服加生薑三片水煎食前服神効。

厚朴散。治妊娠下痢黃水不絕。

厚朴

薑作製

黃連

各三兩

肉豆蔻

五個連皮用

右剉水煎徐徐服。一方肉豆蔻止用一枚。

鴨蛋湯。治婦人胎前產後赤白痢。

生薑

年少者百錢老者三錢重取自然汁

鴨子

一個打碎入薑汁內攪勻

右二味煎至八分人痛漬三錢煎五七沸空心溫服立効。

二黃散

治妊娠下赤白絞刺疼痛

鷄子

一枚烏鷄者位
傾出清留黃用黃丹一錢八鷄子殼內同黃蠟等以
厚紙糊牢塗泥固濟火上煨乾

右研爲細末每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

太小便不通

大全云妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之

薛氏曰前證若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾蘊熱加龍胆瀉肝湯心肝虛熱用加味逍遙散加車前子

亞卿李蒲汀創室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反
虛肝脈弦急脾脈遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱怒所致也
用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散而安

主政王天成之內姪癩疾愈後二便不通其家世醫自用清熱
之劑未效余診其脈浮大而滿此氣血虛也朝用八珍湯加桃仁
杏仁夕用加味逍遙加直前子而痊

大腹皮散 治姪娠大小便不通

大腹皮

赤茯苓

枳殼

炒各一兩

甘草

炙一錢

右爲細末每服二錢濃煎葱白湯調下○一方剉作散入郁李

仁去皮尖一錢半水煎空心連服以通爲度如不通必六腑熱

秘用枳殼炒一錢半大黃炮二錢甘草炙一錢研爲細末作三

便難腸澼陰
腫而用炮乾
人所不敢候
知者韋之

服濃煎葱白湯調下

當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小

便澼產門腫

當歸五分

赤茯苓

枳殼 炒

白芍藥

川芎 各一錢

白薑 炮

木香 煨

粉草 各三分

右用薑水煎服○氣弱枳殼減半○大便秘加蜜同煎

方 治妊娠小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃

木通

檳榔 各一兩

枳殼 炒 七錢半

訶黎勒

四個去核 半生半煨

大腹子 三枚

右為末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

一方 治妊娠風氣大便秘澼

枳殼點炒三兩

防風二兩

甘草火一兩

右爲末每二錢空心用白滾湯調服日三次

又方車前子一兩

大黃半兩

右爲末每服三錢蜜湯調服

又方治虛羸大便秘

枳殼製

阿膠各等分

研滑石末妙

右爲細末煉蜜和劑杵二三千下丸如桐子大別研滑石末爲衣溫湯下二十丸半日來未通再服三十丸止於五十丸

葵子湯治姙娠得病六七日以上身熱八臟大小便不利安胎

除熱

葵子二升

滑石四兩

此利竅除熱藥也

齊集綱目

大小便不通

三二

利非姪娠
所宜用者須
慎

右以水五升煮取一升去渣盡服須臾當下便愈

又方 葵子 一合

川朴硝 二兩

右每服三錢水煎溫服

豬苓散 療姪娠小便澀痛兼治胎水

豬苓 五兩 去皮 為末 白湯調方寸匕加至二七日三夜二不瘥宜

轉下之服後藥

甘遂散 療姪娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不瘥宜

服此下之

用泰山赤皮甘遂二兩為末以日蜜三合和服如豆大一粒

覺心下煩得微下者日一服下之

散不得下日

兩服漸加至半錢以微利全度

右陳良甫氏所錄諸方今並存之內甘遂朴硝非至是至危不得已而爲之不可輕用其他亦宜審訂用之仍味薛氏之說而參之以雜病諸方庶無悞也

○小便不通轉胞遺尿

大全云妊娠小便不通爲小腸行熱傳於胞而不通耳若兼心肺氣滿則多喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干則爲諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉胞若胎滿尿出名曰遺尿

丹溪云轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應効因思胞爲胎所壓轉在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎水道自行

然胎之墜下必有其由。一日吳宅龍人患此脉之兩手似滿。取則弦。左手稍和。予曰。此得之憂患。滿爲血少氣多。弦爲有飲血少。則胞弱而不能自舉。氣多有飲中焦不清。而隘則胞知所避。而就下故。喜隆遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲。隨以指探喉中吐出藥汁。候少頃氣定。又與一貼。次日亦然。如是八貼而安。此法果爲的確。恐偶中耳。後有數人歷歷有效。未知果何如耶。仲景云。婦人木肌盛。頭舉身滿。今反羸瘦。頭舉中空。減胞系了戾。亦致胞轉。其義未詳。必有能知之者。一婦人四十一歲。妊孕九個月。轉胞小便不出。三日矣。下急。腳腫不堪。存活來皆急。子往視之。見其形瘁。脈之右滿而左稍和。此胞食而氣傷。胎系弱不能自舉而下墜。壓着膀胱。偏在一邊。氣急爲其所閉。所以水穀不

又一法以健
人固病婦皆
仰臥時兩足
直伸相對其
健人以足足
低病人足頻
頻細登令病
人身亦細細
頻登則胎自
墮登而上胸
了房而小
更目通矣其
死婦人亦

能出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣既正胎
系自舉則不下墜方有安之理遂作人參常歸身尾白芍藥白朮
陳皮炙甘草半夏生薑煎濃湯與四貼任其叫噉至次早又與四
貼藥查作一貼前令頓飲之探喉令吐出次藥湯小便立通皆黑
水後就此方加大腹皮枳殼青蔥葉縮砂仁二十貼與之以防產
前後之虛果得就蓐平安產後亦健○一婦人妊娠七八個月患
小便不通百醫不能利轉加急脹診其脈細弱予意其血氣虛弱
不能承載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服
補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油
塗手自產門入托起其胎溺出如注脹急頓解一面却以人參黃
耆升麻大劑煮服或少有急滿仍用手托放取溺如此三日後胎

有胞系了戾
溺不出者可
八伶俚收生
婦人以下托
法其轉傷病
隨出之有
將婦兩足
倒提同上如
是數次亦
隨通併附之

漸起小便如故

薛氏曰前證亦有脾肺氣虛不能下輪膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金為火燥脾土鬱熱甚而不利者更當詳審施治

司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余自非八味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起

儒者王文遠室患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸料加車前子一劑即利肚腹頓空而安

仲景云問曰婦人病飲食如故煩熱不臥而反得倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜

腎氣丸主之
即八味丸方見虛勞每以酒再服

水通二

冬葵子散。治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効。

冬葵子

山梔子炒

滑石各半兩

水通三錢

右剉一劑水煎空心溫服外以冬葵子滑石梔子爲末田螺肉搗膏或葱汁調膏貼臍中立通。

全生茯苓散。治妊娠小便不通。

赤茯苓

冬葵子各等分

右咳咀每服五錢水煎空心服。濟生方加髮灰少許極効。葵榆湯。治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂。

葵子研

榆白皮切各一兩

右水煎分三服。

獨聖散。治妊娠小便不通。

蔓荆子涼諸
經之血其性
輕揚有升一
之義

蔓荆子爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母

苦參各四兩

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服三丸加至十丸男子加滑石半兩

雜方 治妊娠卒不得小便

杏仁去皮尖炒黃搗丸如菉豆大燈心湯吞七粒
一方搗杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十九白湯下
一方滑石爲末水和塗臍下
一方車前子搗汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之
一方紫苑爲丸井華水調下二錢
一方桑螵蛸搗末米飯服方寸七日三

子淋

大全云。妊娠小便淋者。乃腎與膀胱虛熱。不能制水。然妊娠胞繫於腎。腎間虛熱而成斯證。甚者心煩悶亂。名曰子淋也。

薛氏曰。前證若小便濁少。淋瀝用安樂散。若腿足轉筋而小便不利。急用八味丸。緩則不救。若服燥劑而小便頻數。或不利。用生地黃、茯苓、牛膝、黃蘗、知母、萸、歸、甘草。若頻數而色黃。用四物加黃蘗。知母、五味、麥門、玄參。若肺氣虛而短少。用補中益氣加山藥、麥門。若陰虛。瘕痺而頻數。用地黃丸。若熱結膀胱而不利。用五淋散。若脾肺燥不能化生。宜黃芩清肺飲。若膀胱陰虛。陽無所主。用滋腎丸。若膀胱陽虛。陰無所化。用腎氣丸。

萬蜜齋曰。子淋之病。須分二證。一則妊娠自病。一則子爲母病。然

姪母白病又分二證或服食辛熱因生內熱者或自汗自利津液燥者其子為母病亦分二證或胎氣熱壅者或胎形迫塞者證既不同治亦有別也。大抵熱則清之燥則潤之通則通之塞則行之。此治之之法也。

五淋散 治孕婦熱結膀胱小便淋瀝。

赤芍藥

山梔子 各二錢

赤茯苓 一錢二分

當歸 一錢

子芩 六分

甘草 五分

右水煎服。

一方加生地黄澤瀉木通滑石在車前子各等分。

子淋散 治姪娠小便澀痛頻數。

麥門冬 去心

赤茯苓

大腹皮

木通

甘草

淡竹葉等分

右剉水煎空心服。一方無甘草大腹皮二味。

安樂散。治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋。

麥門冬去心

通草

滑石

人參

細辛各二錢

當歸酒浸

燈草

甘草各半兩

右爲細末每服二錢煎麥門冬湯調下。

一方無滑石燈心有車前扁蓄。

此方恐滑石太重而滑胎若臨月可用若六七月已前宜斟酌之。

酌之。

加味木通湯。治妊娠奉養太厚喜食炙博酒麪辛熱之物以致

內熱小便赤澀作痛者。

此用細辛自有深意蓋腎精燥故用柔以潤之欲使天降之陰沛然於陰分也。

木通

生地黄

赤芍藥

條芩

甘草

各等分

右剉加淡竹葉十二片水煎服

生津湯 治妊婦嘗病口汗或因下痢後小便短少不痛者此津

液不足也

當歸

甘草

炙各五錢

麥門冬

去心

通草

滑石

各三錢

人參

細辛

各一錢

右爲細末每服六七錢燈心煎湯空心調服

冬葵子湯

治妊婦素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澀而痛者此

胎熱也此方主之

冬葵子

一兩

赤芍藥

條芩

各半兩

赤茯苓

車前子

各二錢

右爲末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞

髮吹能使氣
血上行散轉
胞加之妙

此方寓升於
降妙

此治是熱而
淋者大快通

加髮灰少許極効

大腹皮散 治妊婦八九月胎形肥碩小便短少小腹脹身重惡
寒起則暈眩欲倒此胎氣逼塞膀胱之氣不行也宜此方主之

赤茯苓 三錢

大腹皮

枳殼 炒

甘草 炙各一錢

右爲末每服一錢濃煎葱白湯下

地膚子湯 治孕婦小便澀數名曰子淋

地膚子

車前子

知母

黃芩

赤茯苓

白朮藥

枳殼 炒

升麻

通草

甘草 炙各三分

右切一劑水煎服

地膚大黃湯

治妊娠子淋宜下

大黃 炒

地膚草 各三

知母

黃芩 炒

茯苓

赤芍藥

則小便自利矣

婦科綱目

卷九

三三三

通草

升麻

枳實炒

甘草 各二兩

右剉每服四五錢水煎服

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子 各一兩

黃芩

芍藥

枳殼

車前子 各半兩

右剉每服四錢水煎服

忘憂散 治妊娠心經蘊熱小便赤澀淋瀝作痛

琥珀 不拘多少

萱草根 一握

右琥珀為細末每服五分溫煎萱草根調服

補遺方 治胎前諸般淋瀝小便不通

檳榔

赤芍藥 各等分

此可治氣淋 恐魚熱淋無

右劉每服五錢水煎溫服甚效。

一方治子淋小便數出或熱疼痛及子煩

地膚草四兩以水四升煮取二升半分三服或新取地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無不效。

雜方治姙娠子淋。

葵子一升以水三升煮取二升分再服。一方葵根一把以水三升煮取二升分再服。一方藟藟子七合爲末水和服方寸七日三。一方猪苓爲末白湯調方寸七加至二七。

遺尿。

薛氏曰若脾中有熱宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸。

一婦婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹
 余以為肝火血虛用加味道遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或
 發熱或急怒前證仍作用八珍散逍遙散兼以清肝火養肝血而
 痊

白薇散 治妊娠尿出不知

白薇

白芍藥 各等分

右為末每服二錢食前溫酒調服

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

桑螵蛸 炙黃二枚

右為末每服二錢空心米飲調下

一方 白礬

牡蠣

右為末每服二錢酒調下

本草謂所藥
 白補赤瀉
 金收而火散
 也故子淋
 中多用赤
 遺尿方中用
 白也

尿血之人
皆從勞心
喪中來

一方益智爲末米飲下亦効

○尿血

大全云。姪婦勞傷。經絡有熱。在內熱乘於血。血得熱則流。溢滲入

子脬。故令尿血也。

薛氏曰。前證因怒動火者。宜小柴胡湯加山梔。因勞動火者。宜補

中益氣湯。因厚味積熱。宜清胃散。雜病加犀角。連翹。甘草。因肝經

血熱。宜加味逍遙散。

一姪婦。因怒尿血。內熱作渴。寒熱往來。胸乳間作脹。飲食少。用肝

脈弦弱。此肝經血虛而熱也。用加味逍遙散。六味地黃丸。兼服漸

愈。又用八珍湯加柴胡。丹皮。山梔。而痊。

續斷湯。治姪娠下血及尿血。

分兩差等可
法

形附錄上

分兩

三五

當歸

生地黄各一兩

續斷

半兩

赤芍藥

二錢半

右為末每服二錢空心葱白湯調下

一方治妊娠尿血

阿膠炒

熟地黄

各等分半

右為末空心粥飲調下二錢

薑蜜湯治妊娠小便尿血

生薑七片

蜜半盞

白茅根

一握

右入水濃煎服

加減五苓散

本方去桂加阿膠炒同為麤末每服四錢用車前

子白茅根濃煎溫服

溫清瀉利不
同在人白草

雜方用葵子一升研細水五升煮三升分溫三服

止血之劑

目病大都因火而燥如則胎熟居多故以涼散之劑取効

一方用生艾一觔酒五升煮三升分三服

一方用生地黃一觔酒四觔煮二升分三服

一方猪苓爲末白湯調下一匙日三

一方白茅根濃煮湯奉酒煮黃連丸

一方治無故尿血

龍骨一兩

蒲黃半兩

右爲末每服二錢酒調日三服

○眼目

一婦將臨月忽然兩目失明不見燈火頭痛眩暈項腮腫滿不能轉頭諸治不瘥反加危困偶得消風散服之病減七分獲安分婦其眼吊起人物不辯乃以四物湯加荆芥防風更服眼利天門冬

飲子二方間服。目漸利明。大忌酒麪煎炙雞羊鷺鴨豆腐辛辣熱物并房勞。此謬因懷妊多居火間。衣著太煖。伏熱在內。或酒麪炙燂太過。以致胎熱也。

天門冬飲子。治妊婦肝經風熱。上攻眼目。帶眵失明。

天門冬 去心 知母 菟藟子 五味子

防風 去苦 茯苓 去皮 川羌活 去片 人參 各一

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服。

○臍燥悲傷

仲景云婦人臍燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠仰甘麥大棗湯

圭之

臍燥者肺金燥也肺之志為悲胎熱更火炎肺不能自持故無故悲哭乾治以涼甘緩佐以涼

許學士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有祟祈

神而愈古人謂

痛無不愈矣

請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人臍燥悲傷欲哭象如神靈數次伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

薛氏曰前證或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一妊婦無故自悲用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四

君子加山梔而安

一妊婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯

為主佐以八珍湯而安

甘麥大棗湯 治婦人臍燥悲傷不止

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

悲傷肺病此方補脾所謂補母也此甘能生濕濕生則又何燥焉

淡竹茹湯

治妊婦心虛驚悸臟燥悲傷不止又治虛煩甚効

麥門冬

去心

小麥

半夏

湯炮各一錢半

人參

白茯苓

各一錢

甘草五分

右作一服加生薑五片棗一枚淡竹茹一團如指大水煎服

一方

治胎動燥悲哭及自笑自哭

用紅棗燒存性米飲調下

○妊病下胎

大全云妊婦羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭不能養胎致胎

動而不堅固若終不能安者則可下之免害妊婦也

薛氏曰前證宜用腰腹背痛門方論主治其胎果不能安者方可

議下慎之慎之

詳下虛之慎之

生宜熟補之
訖復身而實
非真思之

大中丞許慎微公向令金壇時夫人胎漏療治不止時迫於上計
公欲因其勢逐下之謀於余余第令服佛手散以爲可安即安不
可安即下順其自然而已既數服公憂疑不決女科醫者檢方以
進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂
信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知此知而馳至則聞
盈庭皆桂麝氣蓋因胞衣未下女醫又進香桂散矣血遂暴下如
大河決不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過余謝
且諭余曰牛膝藥而能墮胎何也余對曰生則宜而熟則補故
破血之與墮精如前鋒相拄豈獨牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎
爲白膠則安胎止血因其熟而信其生此之謂麓工公嘆恨無已
余故特著之以爲世戒

桂心散。治婦人因病胎不能安者可下之。

桂心 瓜蒌 牛膝 藟麥各五分 當歸 一錢

右剉水煎服。

一方。單用牛膝二兩酒一鍾煎七分作二服。

千金神造湯。婦人脈陰陽俱盛名曰雙軀若少陰微緊者血即

凝滯經養不用胎即偏大其一獨生其一獨死不去其死害母

失胎此方主之。

蟹瓜 一升 阿膠 三兩 甘草 二兩

石剉取東流水一斗先煮蟹瓜甘草至二升去滓下膠令烊頓

服之不能分再服。

下胎方。治妊母因疾病胎不能安可下之。

阿膠固胎蟹瓜破血日草和中並行不悖奇哉

去滓分溫三服立下

法用礪故
破胎

取七月七日法麴大令四兩水二大盞煎取一盞三分編漚
去滓分溫三服立下

又方大麴五升清酒一斗煮三沸去滓分五服隔宿勿食但再服
其子如糜母無疾苦千金不傳妙方

麥蘖能破血

又方麥蘖一升爲末和水煮二升服之卽下神効

又方附子二枚爲末以清苦酒和塗右足去之大良

又方取雞子一枚以三指撮鹽放雞子中服之立出

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散諸方要全善皆不之取而獨取

此數方其見卓矣

防胎自墮

丹溪云陽施胎化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞

昇用白朮補
中以莖出中
焦土生萬物
也

熟艾性溫亦
助相火若果
有熱或恐不
宜

怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因熱火消物造化自然
病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也子見賈氏婦但
有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則滿知其血
少也以其妙年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯
下黃芩末一錢服三四十帖遂得保全其生因而思之墮因內熱
而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所
以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸
無輕視

一婦年三十餘或經住或成形未具其胎必墮察其性急多怒色
黑氣定此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷精故也因令住經
第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子

一婦住經三月後尺脈或瀦或微弱其婦却無病知是子宮真氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至產血塊或產血胞一婦腹漸大如懷子至十月求易產藥察其神色甚困難與之藥不數日生白蟲半榻蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而爲穢腐蘊積之久濕化爲熱濕熱生蟲理之所有亦須周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及一月而死濕熱生蟲譬之溝渠污濁積久不流則諸蟲生於其間矣

汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常患墮胎已七八兒矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗甚胎無滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒也況三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多

平陰系十 卷九
在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃檗黃芩煎服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子。

錢仲陽治一孕婦病醫言胎日墮錢曰姓者五臟傳養率六句乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全。

陳斗崑治一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脈洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脈洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脈如前以蛇脫煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛復一死胎隨下病亦愈。

程仁甫治一婦年近四十稟氣素弱自去其胎五日內漸漸腹脹如鼓至心前上吐不能食用補藥不效診六脈微弱但只叫脹死。

此乃損傷脾氣而作。脹然急則治標。若泥丹溪法。恐緩不及事。用桃仁承氣加枳實厚朴。倍積黃煎服四分。吐去。其一次早仍不通。事急又服琥珀丸三錢。至申時大通。脹減。但体倦四肢無力。口不知味。發熱。再用參芪歸芍。查木陳皮八劑而安。

江應宿治汪錫妻。三十五歲。厭產。誤服打胎藥。下血如崩。旬餘腹痛一陣。即行。或時鼻衄。諸藥不効。診得六脈數而微弦。乃厥陰之火泛逆。投四物換生地黄。加阿膠炒黑。山梔蒲黃一劑。愈。

薛氏云。大抵治法。須審某月。屬某經。宜養而藥之。

芎藭補中湯。治懷妊血氣虛弱。不能衛養。以致數月而墮。名曰半產。每見婦人孕不備十月。而損墮得服此遂安全。

芎藭 五味子 阿膠蛤粉炒 乾薑炮各一錢 黃耆去芦 當歸酒浸

白芍藥

白朮

各一錢半

人參

杜仲

去皮

木香

不見火

甘草

炙各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

阿膠

治妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠

炙燥

熟乾地黄

焙

艾葉

微炒

芎藭

當歸

切焙

杜仲

去粗皮炙剉

白朮

各一兩

右咳嗽每服四錢茶三枚水煎食前溫服

千金保胎丸

凡女人受孕經三月而胎墮者雖氣血不足乃中

衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕至此時必須節飲食

絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

白朮

土炒

熟地黄

薑汁炒

杜仲

薑汁炒各四兩

當歸

酒洗

續斷

酒洗

阿膠

蛤粉炒

香附米

四製

益母草

條芩

炒各二兩

陳皮

三月雖手心主養胎而其十二經皆受氣於陽明陽明屬中衝故中衝傷胎亦墮也此方極穩當

右為獨未道藥為為丸加附子大每服百九空心米易下

胎繫於腎故用杜仲補腎若云胎動不安則有脾虛氣虛血虛者寒有熱之不同又當因病而藥之不可執也

川芎 艾葉醋炙各一兩 砂仁炒五錢

右為末。煮藥內為丸。如桐子大。每服百丸。空心米湯下。

杜仲丸。治妊娠三兩個月。胎動不安。防其欲墮。宜預服之。

杜仲去粗皮。薑汁炒去絲。

右為末。棗肉杵丸。桐子大。每服七十丸。米飲下。

刪繁方。治妊娠懷胎數落而不結寔。或冷或熱百病之源。

黃耆 人參 白朮 甘草 川芎

地黃 吳茱萸各等分。一方有當歸。乾薑。

右為末。空心溫酒調下二錢。忌菘菜桃李雀肉醋物。

婁氏曰。按丹溪論。俱是虛熱而無寒者。今姑存此一方。以俟施之於千百而一者也。

胎墮後爲半產。

夫妊娠日月未足。胎氣未全。而產者謂之半產。蓋由妊娠衝任氣虛。不能溫養於胎。胎氣不固。或癱撲閃墜。致氣血損動。或因熱病溫瘧之類。皆令半產。仲景謂寒虛相搏。此名爲革婦人。則半產偏下是也。

又云半產俗呼小產。或三四月。或五六月。皆爲半產。以男女成形故也。或因夢恐悲哀暴怒。或因勞力打撲損動。或觸冒暑熱。忌惡神散。恐犯熱藥。轉生他疾。且玉燭散和經湯之類。便產須知云小產不可輕視。將養十倍於正產可也。又云半產卽肌肉腐爛。補其虛損。生其肌肉。益其氣血。去其風邪。養其臟氣。將養過於正產十倍。無不平復宜審之。

此口下不平有各處此經之

薛氏曰小產重於大產蓋大產如粟熟自脫小產有如生採破其
皮毀傷其根蒂也但人輕忽致死者多治法宜補形氣生新血去
瘀血若未足月痛而欲產芎歸補中湯倍加知母止之若產而血
不止人參黃芪湯補之若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎氣弱
而小產者八珍湯固之若血出過多而發熱者聖愈湯汗不止急
用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕八珍湯大渴面赤脈洪而虛當歸
補血湯身熱面赤脈沉而微四君加薑附東垣云晝發熱而夜安
靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰分
也如晝夜俱發熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大
寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止時節
而動是無水也如太熱而甚寒之不寒是無水也動復止倏忽

往來時動時止是無水也。若陽氣自旺者，四物二連湯。陽氣陷於陰者，補中益氣湯。重陽無陰者，四物湯。無火者，八味丸。無水者，六味丸。

倍法加法俱有獨見

一姪婦五月，服煎紅丸，墮胎，腹中脹痛。服破血藥，益甚。手按之愈痛。余曰：此峻藥重傷脾胃，受思用八珍，倍參耆，加半夏，乳沒二劑，痛止數劑全愈。

史仲子室年甫二十，因疫胎隨時咳，服清肺解表，喘急不寐，請視。余曰：脾土虛不能生肺金，藥重損之。與補中益氣，加茯苓、半夏、五味、炮薑四劑，漸愈。再往視，又與八珍加五味及十全大補湯而全愈。

東垣云：婦人分娩及半產漏下，昏白不省，瞑目無所知覺，蓋因血

所謂有兩死
而無兩生也

暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則
安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰
血暴去不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃甘
辛大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽便二者俱
傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之
熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也
汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血必天天年又不知內經
有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下
又不知傷寒鬱冒得汗則愈見禁用寒涼藥也分挽半產本氣不
病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神昌常時血下降
亡今當補而升舉之心得血養而神不昏矣血若暴下是秋冬之

妙在升陽

癸巳刊目

卷九

五

今大旺令舉而升之助其陽則目張神不昏矣今立一方補血

血生血益陽以補手足厥陰之不足也各全生活血湯生後後諸證更於產

後方論中
下用之

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或寒或熱

腹虛脹疼痛

人參

麥門冬去心

生乾地黄

當歸洗

芍藥炒

黃芩

白茯苓

甘草炙各一兩

右咳咀每服三錢水一盞煎七分食前溫服

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止

人參

黃耆炒

白朮炒

當歸

白芍藥

艾葉各一錢

阿膠炒二錢

別錄謂人參能治心腹鼓痛故用之蓋虛痛也若寔痛則不宜

此重在惡血不止故薑艾之用也

陰從陽升故用藥如此

三陰三陽之氣俱升

右作一劑水煎服

龍骨散 療因損娠下惡血不止

龍骨 當歸 地黃各二兩 芍藥 地榆 乾薑 阿膠各一兩半

艾葉炒一兩 蒲黃三兩二錢半 牛角腮炙焦二兩半

右為細末食前用米飲調下二錢

全生活血湯 治婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知

覺此因血暴亡心神無所養也用此補血升陽

升麻 白芍藥各三錢 當歸 酒洗 葛根 柴胡去苗 羌活

獨活 防風 甘草炙各二錢 川芎 蘇本各一錢五分 生地黄夏月加

熟地黄各一錢 蔓荊子 細辛各五分 紅花三分

右咬咀每服五錢煎至一盞去滓食前稍熱服

○已上治血下過多之劑

生地黄湯。治妊娠胎氣損動。氣血不調。或顛撲閃墜。以致胎墮。

墮後惡滯不盡。腹中病痛。

生乾地黄兩一 大黃暴 芍藥 白茯苓 當歸

細辛 黃芩 甘草炙 桂去麋皮 各半兩

右咬咀。每服五錢水一盞半。入生薑大棗拍碎同煎。至一盞去

滓。不拘時溫服。

當歸酒。治妊娠墮胎後血不出。

當歸炙令香 芍藥炒各二兩

右咬咀。每服三錢。無灰酒一盞。入生地黄汁一合。銀器內慢火

煎至七分。去滓溫服。以惡血下為度。

妙在桂與大黃同用。然須認病重切方可。

產後忌芍藥。

而此以血不

出者。用之要

知。只當歸同

用。以無灰酒

正地汁同者。

則不收斂而
入肝行血矣

烏金散

治妊娠墮胎後血不下兼治諸疾血病

好墨

二兩折二寸挺子燒通赤用好醋一升
蘇七遍又再燒通赤放冷另研為末

沒藥

研 麒麟竭各二錢半

麝香

一錢

右為細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用童便加酒調下

二錢七

紅藍花散

治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍花

微炒 男子髮燒存 京墨 燒紅 血竭 研

蒲黃

濕紙炒 各等分

石為細末以童便小半盞調二錢服之立効

白蜜酒 治墮胎後惡血不出

白蜜 二兩

生地黄 取汁 一盞

酒 半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩服服三劑百

妙在緩肝行
血以上諸方攻
補不同所謂

寒熱溫涼
從其事用
者審之

此方治血滑
利推生下胞
俱可用

方法俱妙宜
討之

濟陽雜錄

卷九

四二

病可愈

○已上治惡血不出之劑

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸

牛膝

酒浸各一兩半

木通

滑石

研各二兩

冬葵子

瞿麥穗

一兩

右咬咀每服三錢水煎服未下再服以下為度

地黄湯 治胞衣不出

蒲黃

生薑

生地黄

半兩以銅竹刀切炒

右以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分三服未下再

作服

澤蘭湯 治胞衣不出

右以水三盞生薑切半斤至一盞半去滓入骨石末並由煎三

澤蘭葉

研滑石末

各半

生麻油

許

煎

右以水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末並油更煎三沸頓服之未下更服

蒲黃酒治胞衣不下

一方二麥巧似化工

蒲黃炒一合

槐子十四枚為末

右以酒三盞煎至一盞去滓分溫三服未下更作服

已上治胎衣不下之劑

當歸川芎湯治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 玄胡索少 紅花

香附 陳皮 澤蘭 牡丹皮 桃仁各等分

右水煎入童便酒各小半盞服

尤妙

平正之方可法可法

既曰今痛則
不宜芍藥又
曰腹痛則不
宜白朮用者
詳之

此方以氣血
虛弱而用則
可以惡露內
停而用芍藥
白朮越不宜
病似陽明症
象白虎故云
然

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜此藥或失笑散消之若按之
不痛此是血虛宜四物參朮白朮

芎藭湯 治墮胎心腹冷痛

芎藭

芍藥

白朮

阿膠

炒令燥

甘草

炙各一兩

一方無白朮有人參

右咀每服三錢入艾葉糯米生薑同煎食前服

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸

白芍藥

川芎

黃芩

炒各二兩

白朮

五錢

右為細末溫童傾調下二錢

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉滑

大而虛重按全無此脉虛血虛也若誤服白虎湯必死

此東垣補力
也病氣當
一服如神

此河間方後
二味非甚熱
火不用

當歸三錢

黃耆一兩

右作一服水煎服

四物二連湯 治血虛發熱或口舌生瘡或晝夜熱

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 胡黃連 宜黃連各一錢

右作一服水煎服

胎不長

大全云妊娠不長者因血虛或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱而胎不長也當治其疾以益其氣血則胎自長矣

薛氏曰前證更當察其經絡審其所以因而治之

一妊婦胎六月體倦懶食面黃肺熱而胎不長因勞欲墮此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓二十餘劑脾胃漸健胎安而長

齊合綱目

卷八胎不長

四八

天地以大氣
春生夏長人
身以心肝應
之若有宿冷
者春氣不溫
也以吳茱萸
溫之胎瘦不
長者夏氣不
大也以川芎
大之白水甘
草乃培土以
補其母也以
此為法思過
半矣

此方慈以補
氣為主而前
胡散結氣川
芎行結血皆
所助其生長

一妊婦因怒寒熱往來內熱脯熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此
因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗病愈而胎
亦長矣

安胎白朮散一治妊娠道有冷胎瘦不長或失於將理傷胎多障
此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎

各一兩

吳茱萸

湯泡半兩

甘草

炙一兩半

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果是

黃薯湯 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃薯

炒

白朮

炒

白茯苓

前胡

人參

各七分半

川芎

甘草

炒各五分

也。現其主治
乃得其妙。

此方以風冷
而用川椒、川
芎以傷動而
用白朮、牡蠣
阿膠生地涼
血固胎不多
用者畏其涼
也。當歸一兩
其血中之土
藥歟。故以為
君。
分兩奇。
此方助生氣
寬中有胎又
是二法。

右咬咀。加生薑三片。棗二枚。水煎。食前服。

長胎白朮丸。

治孕婦宿有風冷。胎瘦不長。或將理失宜。傷動胎

氣。多致損墮。常服益血保胎。調補衝任。

白朮

川芎

阿膠

生地黄

各六分

當歸

一兩

牡蠣

二分

川椒

三分

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服三十丸。米飲下。

人參丸。治妊娠胎不長。宜服養胎。

人參

白茯苓

當歸

柴胡

刺蘇

厚朴

桑寄生

各

枳殼

七錢

甘草

半兩

右為細末。煉蜜丸。如桐子大。每服二十丸。食前溫水下。

先期欲產。過期不產。

大全云婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後治法

婁氏曰先期欲產者涼血安胎過期不產者補血行滯

薛氏曰一姙婦八個月胎欲墜似產臥久少安日晡益甚此氣血

虛弱也胡用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯數劑而

安

知母丸 治姙娠日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不均多少為細末煉蜜丸如雞子大溫酒嚼下日三

服 一方丸如桐子大粥飲下二十丸

槐子丸 治姙娠月數不足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃 各等分

治子煩胎熱
妙劑

此方與治胞
衣不下諸黃

酒同而一以
酒則作湯一
以蜜丸酒下
煎丸分兩雖
殊而其藥則
一也宜致想
之

右爲細末蜜丸如桐子大溫酒下二十丸以痛止爲度

又方取蒲黃篩過如棗核大以井花水調服

又方搗菖蒲根汁一二升灌喉中

又方梁上塵灶突墨同爲末空心溫酒服方寸匕

加味四物湯治過月不產者用此補血行滯

四物湯 香附 桃仁 枳殼 縮砂 紫蘇

右用水煎服卽生

○鬼胎

大全云夫入臟腑調和則血氣充寔風邪鬼魅不能干之若榮衛

虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

薛氏曰前證因七情相干脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖

違而致之者。乃元氣不足。病氣有餘也。若見經候不調。就行調補。庶免此證。治法以補元氣爲主。而佐以雄黃丸之類。行散之。若脾經鬱結氣逆者。用加味歸脾湯調補之。若脾虛血不足者。用六君芎歸培養之。肝火血耗者。用加味逍遙散滋抑之。肝脾鬱怒者。用加味歸脾逍遙二藥兼服。腎肝虛弱者。用六味地黃丸。

一婦人經閉八月。肚腹漸大。面色或青或黃。用胎證之藥。不應。余診視之。曰。面青脈濇。寒熱往來。肝經血病也。面黃腹大。少食體倦。脾經血病也。此鬱怒傷脾肝之證。非胎也。不信。仍用治胎散之類。不驗。余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑。諸證稍愈。彼欲速效。遂服通經丸一服。下血昏憤。自汗惡寒。手足俱冷。嘔吐不食。余用人參炮薑二劑。漸愈。

人說今補黃星二補新愈

斬鬼丹 治鬼胎如抱一甕

吳茱萸

川烏一方作川芎

秦艽

柴胡

白僵蚕

巴戟

巴豆不去油 芫花醋煮各二兩

卜三方皆治諸中怪疾之假氣血而成形者又何獨論鬼胎之有

斑貓宜慎用

斑立丸 治鬼胎惑於妖魅狀如癥瘕一切氣血痛亦効

斑貓去頭足翅炒

玄胡索炒各三錢

右為末糊凡酒下或為末以溫酒調下半錢以胎下為度

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃細研

鬼白去毛

莽草

丹砂細研

巴豆去油

獺肝炙黃各半兩 蜥蜴一枚 蜈蚣一條炙黃

雖曰有故無煩然大毒之藥亦須慎也

此方甚平何
以能治癥瘕
痞塊惟疑似
者庶乎可矣

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二丸空心溫酒下日兩服後
當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極
者下蛇蟲或如蝦蟇卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除
枳寔檳榔丸治妊娠癥瘕癖塊及二者疑似之間久服安養胎
氣消散癥瘕兼寬膈進食

枳寔

檳榔

黃連

黃栢

黃芩

當歸

阿膠炒成珠

木香

右爲末水和丸如小豆大每服三十丸溫水飲下不計時日三
服

濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍瑤璋父訂正

西陵 汪 淇瞻漪子評釋 天都 查 望于周父叅閱

臨產

論臨產調理法

原有產圖此
不載錄亦
由法也

催生藥切不
可早若兒未
轉身宜以補
血為主而宜

大全云凡妊娠至臨月當安神定慮時常步履不可多睡飽食過
飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位密鋪床帳預請老練穩婆備辦湯
藥器物欲產時不可多人喧闐惶惶但用老婦二人扶行及凭物
站立若見漿水腰腹痛甚是胎離其經令產母仰臥令兒轉身若
兒頭向產門方可用藥催生坐草若心煩用水調服白蜜一匙覺
饑喫糜粥少許勿令飢渴乏其力不可強服催藥早於坐草慎

氣佐之

中指屬心胞
絡也

固血之說宜

玩

八珍益母配
法服法俱佳

之

薛氏曰欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待兒轉身向下時
作痛試捏產母手中指中節或本節跳動方與臨盆即產矣若初
覺不仰臥以待轉胞或未產而水頻下此胞衣已破血水先乾必
有逆生難產之患若胎衣破而不得分娩者保生無憂散以固其
血自然生息如血已耗損用八珍湯料一觔益母草半觔水數十
碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹痛未產也若連腰痛
甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於腎故也凡孕家宜預請有仁心
知事穩婆當以恩結其心先與說知倘有生息不順只說未產或
遇雙胎只說胎衣未下悲驚則氣散愈難生息余家親驗之大抵
難產多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎前清氣產後補血

不可專執若脾胃不實氣血不充宜預調 不然臨產必有患難

○論臨產催生法

大全云大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等

藥或勢不得已則服之又云切不可坐早及令穩婆亂動手凡催

必候腰痛甚胎轉高下漿水破方可服大法滑以流通濕滯若以驅逐閉塞香以開

竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疾困者固血

丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

○論難產由於安佚氣滯

大全云婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家

過於安逸以致氣滯而胎不轉或為交合使精血聚於胞中皆致

產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟入手試水致胞破漿乾

固血如開水
最和當

血暈血溢以
水解之在腎
月尤宜餘月
亦無害惟少
與之

兒難轉身亦難生矣凡產血候痛極兒逼產門方可坐草時當盛
暑倘或血暈血溢當飲清水解之久未春初產室用火和煖下陪
衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難

論難產由於氣虛不運

丹溪曰世之難產者往往見於鬱悶女佚之人富貴奉養之家若
貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方爲湖陽公
主作也實非極至之言何也見有用此方者其難白若子表妹苦
於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形肥勤於針指回
思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實
耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈
弱兒在胞胎用母氣不能自運宜當補其母之氣則兒健易產矣

此紫蘇飲最
穩當法

今其有孕至六七個月來告遂以大全方紫蘇飲加補氣藥與數
十貼因得兒而甚快後遂以此方隨母形色性稟察時令加減與
之無不應者因名其方曰達生散

○論難產由於血滯血乾

郭稽中曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯
兒身不能便利是以難產急服勝金散消其血使兒自易生陳無
擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水
乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫
產當用前法針刺之

大全云治胞漿先破惡水來多胎乾不得下須先與四物湯補養
血氣次煎濃葱湯放冷令穩婆洗產戶須是款曲洗令氣上下通

暢更用酥油滑石末塗產口。裏次服神妙乳硃丹。或葵子加聖散。

楊子建十產論

一曰正產者。婦人懷胎十月滿足。忽腰腹作陣疼痛。相似胎氣頓陷。至於臍腹痛極。乃至腰間重痛。穀道挺進。繼之漿破血出。兒自遂生。

此學春字法。
可於十日令
兒女子熟閱

二曰傷產者。蓋因人之生陰注陽。定各有時日。不可改易。今有未產一月。已前忽然臍腹疼痛。有如欲產。仍却無事。是名試月。非正產也。但一切產母。未有正產之候。即不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之婦。臍腹疼痛。兒身未順。收生之婦。却教產母虛亂用力。兒身纔方轉動。却被產母用力一逼。使兒錯路。忽橫忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當之所致也。凡產母用力。須待兒

之。

子順身臨遍門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產之正氣令兒速得下生

補正氣確是

良工

有用八參五錢催生最妙

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生

如見此症可用涼水益元催之

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多執氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼而赤昏昏如醉乃至不知人事

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令有生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之候其身正前催生藥一盞吃了方可用力令兒下生

七日側產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉使直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順

母氣弱而倒產者當服補劑若用力早者又當別論

正頂三法

八曰偏產者。兒身未正。產母用力一逼。致令頭偏在左。腿或偏在右。腿故頭雖露。偏在一畔。不能生下。當令產母仰臥。次令看生之人。輕輕推兒近上。以手正其頭。令兒頭頂端正。然後令產母用力一送。即便生下。若是小兒頭後骨偏在穀道。只露其額。當令看生之人。以綿衣炙溫。裹手於穀道外邊。輕輕推兒頭正。便令產母用力送兒生也。

九曰礙產者。兒身已順。而露正頂。不能生下。蓋因兒身回轉。肚帶攀其肩。以此露正頂。而不能生。當令產母仰臥。令看生之人。輕輕推兒近上。徐徐引手。以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令產母用力一送。便兒生下。

十曰坐產者。兒將欲生。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。急於高處。

繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也

十一曰盤腸產者臨產母腸先出然後兒生趙都運恭人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚以為苦醫不能療偶在建昌得坐婆一法而收之其法以醋半盞新汲水七分調停喂產母面每喂一縮三嚥盡收此其法也

產難治驗

不乳不產也
其根惡毒者
其本草並無
催生語然其
產惡亦成感
其毒氣而胎
下也
淳于意治菑州王美人懷子而不乳召于意往飲以黃蘗藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆比五六枚
滑伯仁治一婦難產七日而不乳且食甚少伯仁視之以涼粥一

調用涼者以
其煩也又涼
則性降
本草楓葉亦
能催生今村
婦亦常用之
臨月洗浴第
不知胃氣不
足者亦可用
否耳

法術神奇罕
聞見耳

孟搗楓葉煎湯調啖之旋乳或詰其理滑曰此婦食甚少未有無
穀氣而生者夫楓葉先生先落後生後落故以作湯飲也

龐安常治一婦產七日而子不下百治不効龐視之令其家人以
湯溫其腰腹自為上下按摩孕者覺腸胃微痛呻吟間生一男其
家驚竄而不知所以龐曰兒已出胞但一手誤執母腸不能脫非
符藥所能為吾隔膜門兒手所在鍼其虎口痛即縮手所以遽生
無他術也取兒視之右手虎口鍼痕存焉

一婦累日產不下服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼
氣結而不行非不順也素問曰恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上
焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以紫蘇飲一服便產及

治婦人子懸證紫蘇飲見胎前脹滿

吳以卽重前
或用草亦可
性最溫利故
君之

德產治驗法
奇而正妙妙

吳菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔効吳因製
一方以重前子爲君冬葵子爲臣白芷枳殼爲佐使已服午產家
醫異之吳曰本草謂催生以此爲君毛詩採芣苢以防產難是也
劉復真遇府判女產不利已歛劉取紅花濃煎扶女于甕上以綿
帛蘸湯蓋之連以澆帛上以器盛水又煖又淋久而甕醒遂生男
子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫卽產見亦神矣

一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷經藥甚窘以椒橙葉
莢等煎湯司下手則和臍腹產四處皆淋洗之氣溫血行遂產
論交骨不開

薛氏曰交骨不開產門不開皆出元氣素弱胎前失於調攝以致
血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中

益氣湯。產門不閉。氣血虛也。用十全大補湯。

地官李孟卿娶三十五歲女。爲繼室。妊娠慮其產難。索加味芎歸湯四帖。備用。至期果產門不開。止服一帖。頓然分娩。

上舍費懷德之室。產門不開。兩日未生。服前藥一劑。卽時而產。主舍傳此方用之者。無有不驗。

一婦人分娩最易。至四十妊娠。下血甚多。產門不開。與前湯一劑。又以無憂散。煎熟時飲之。以助其血而產。

論胎死腹中

準絕云。產難子死腹中者。多因驚動太早。或觸犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯涸而死。故也。須驗產母舌若青黑。其胎死矣。當下之。

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者毒藥下之

其有用攻堅之藥而無益者以產母之本氣竭而仲不使也宜補之愚意虛劇者朴硝同補劑下之何如

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下利水而愈一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

○臨產脈法附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈是太牢強弦緊者生沉細者死○脈勻細

易產大浮緩氣散難產

脈訣云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來

朝日午定知生○身重體熱寒又頻舌下之脈黑復青反舌上冷

離經有以六七至者有以一二至者離者經之言離其當經為當

朝日午定知生。身重體熱寒又與舌下之脈黑復毒反舌上冷

子當死腹中須遣母歸冥面赤舌青細看母活子死定應難唇口俱青沫又出母子俱死總教懷面青舌赤沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗母之賢哲不虛陳

臨月束胎方

束胎丸 胎瘦易生服至產則已

白朮

枳殼 去穢炒 各等分

右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五丸溫水下
連生散 一孕至八九個月內服十數帖甚好易產

大腹皮 三錢

人參

陳皮

紫蘇葉 各五分

歸身尾

白朮 各一錢

白芍藥 各一錢

甘草 各二錢

右切作一服入青葱五葉黃楊腦七個即黃楊樹葉稍見食少胎瘦者不須用水

燒飯用荷葉煎湯更妙

加法俱妙甚

即束胎丸變法也若氣血不足者當再酌之

煎服○或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩○秋加澤瀉○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣寔加香附陳皮○血虛加當歸地黃○形寔倍紫蘇○性急多怒加黃連柴胡○執甚加黃芩○濕痰加滑石半夏○食積加山楂○食後易飢倍黃楊腦○腹痛加木香官桂○

又方一第九個月服

酒芩酒炒一兩虛弱人不宜涼藥者減半白朮一兩枳殼麩炒

滑石各七錢半臨月十日前用小便多者減此一味

右為末粥丸桐子大每服五十丸空心熱湯上○氣寔人宜服多則恐損元氣

滑胎枳殼散○妊孕七八個月常宜服滑胎易產湖陽公主每產

此方為安逸
氣卑者設

兩方兼服同
妙然與氣虛
者非宜

累日不下南山道人進此方

商州枳殼麤炒

二兩

粉甘草炙

兩

右為細末每服二錢百沸湯點服日三服○溫隱居加當歸廣
木香各等分○許學士云枳殼性苦寒若單服之恐有胎寒胎
痛之疾以地黃當歸蜜丸佐之可也○名內補丸蓋枳殼散破氣
有餘而內補丸補血不足也

內補丸 治妊娠衝任脈虛補血安胎與枳殼散同服

熟地黃二兩

當歸一兩
微炒

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九溫酒或滾湯下

張氏方 治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治

腸中諸疾下氣寬隔

氣寔者宜之

牛大忌
非胎產所宜

枳殼 五兩

甘草 一兩

香附子 三兩炒
去毛

右為末，薑湯點服。如丈夫婦人冷氣攻刺，脇肋疼痛者，用葱白三寸同煎服。○婦人脾寒血氣成塊，作刺，熱酒調服。○大小便不通，白牽牛湯調服。

保生無憂散。治姙娠身居安逸，口厭甘肥，憂樂不常，食物不節，

致胞胎肥厚，根蒂堅牢，或瘦人血少胎弱，臨產難產，入月服之，則易生也。

當歸

川芎

白芍藥

枳殼 麩炒

木香

甘草

炙各一錢半

乳香

另研

血餘

燒存性另研各五分

右作一服，水煎入乳香，血餘和勻，不拘時服。

神寢丸。

瘦胎滑利，易產臨人月服之神效。

惟宜氣盛者
故臨月可服

通明乳香半兩
另研

枳殼剉炒
一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下

難產催生方

三合濟生湯。以枳殼青歸達生三方抽其精粹而成合此湯治

臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸三錢

川芎

枳殼剉炒各
二錢

香附子炒

大服皮薑汁洗各
一錢半

蘇葉八分

粉草七分

右用水煎待腰腹痛甚服之即產○一方加白芷一錢

佛手散即芍
歸湯

治難娠因事仆跌子死腹中惡露妄行疼痛不已

口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立使遂下若腹痛隨止子

母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如

加白芷行血
海之氣也

投酒之法更妙然看緩急用

立瘥以交骨不開為陰氣重為至陰按則交錯仰解故用之

中風血崩惡露不止腹中血刺痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂死等證並皆治之○丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

當歸酒洗去蘆三兩

川芎四錢一方各等分

右細剉分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五七沸溫服如口噤搦開灌之如人行五里許再灌一服盡此四服便立有神驗○如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白水重便各一盞用藥四錢煎服○如胞產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭髮燒灰為末每三錢酒調服

症力危矣而
不用人參當
以等藥且以
神麴麥弄陳
皮莖根者向
益用力太過
則胃氣乏矣
故亟扶之救
其胃氣又一
活法也

來甦散 治臨產用力太過氣服衰微精神困倦頭眩目暈口噤

面青髮直不省人事

木香 神麴 陳皮 去白 麥蘖 炒 黃蓍 阿膠珠

白芍藥 苧根 甘草 各二錢 糯米 一合 生薑 切碎 炒 黑 一錢

右剉細水煎挖口灌之連進為妙

黑神散 一名催生 治根生逆產其功甚大並治胎前產後虛損

月水不止崩漏等證

百草霜 白芷 不見火 各等分

右為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒

煎進二服然血得壅則止此藥大能固血又免血涸甚妙

一 方加白滑石煎芎歸湯調下

催生立應散。治難產及橫生逆產。

車前子

當歸各一兩 冬葵子

白芷各三錢 牛膝

大腹皮

枳殼 川芎各二錢

白芍藥 一錢

右剉水煎熟。入酒少許服立產。

榆白皮散。治姙娠滑胎易生。

榆白皮

甘草各二兩

葵子 一兩

右為末。每服五錢。水煎服。

一方專用榆白皮焙乾為末。臨月日三服。方寸七。令產極易。

如聖散。專治孕婦難產。

紫蘇葉

當歸各等分

右以每服三五錢。用長流水煎服。無長流水。以水順攪。乾煎。

有吸且每服三五錢用長流水煎服無畏長流水以水順地燒

催生散 治難產并胞衣不下

白芷 滑石 伏龍肝 百草霜 甘草 各一錢 五分

右為細末用葛歸湯入酒童便各少許調服二次立効

催生飲 治臨產生育艱難

當歸 川芎 大腹皮 洗枳殼 麩炒 白芷 各等分

右剉水煎溫服 一方無大腹皮有益母草火麻仁

催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿水下方服

桃仁 炒去皮 赤芍藥 牡丹皮 官桂 白茯苓 夫皮各一錢

右剉一劑水煎熱服

活水無忌散 專治十月已滿多因恣情及多喫熱毒之物瘀血

相搏臨產橫逆之厄 惶忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼加

此以破血為主血氣盛者宜之若今人不辯氣血虛是一概混用可嘆

烏金丸失載
查附

濟陰雜記

卷一

十二

烏金丸二顆効如神。

益母草

急性子

當歸

各四兩

陳枳殼

兩生地黃

蘇葉

赤芍藥

各一錢

肉桂

川芎

陳艾

各一錢

甘草

八分

活鯉魚

一個

右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚

出魚死則難取効矣後下藥煎至二碗臨服之時加入好醋一

茶匙每一碗和調烏金丸一顆如死胎不下急取無根水再煎

藥渣連服二次。

烏金丸

一名七

七聖散

寶散

臨產腰痛方可服。

當歸

玄胡索

香白芷

焙

白礬

薑黃

沒藥

桂心

各等分

白藥固腎亦
固血之意即

右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調下臨陣疾時一二服

立產

一方。治難產累日氣力乏盡不得生。此是宿有病者。宜此方。

阿膠二兩

赤小豆二升

不益氣力治宿病而單用大劑肉桂催生此急因急急用法也妙

右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出

勝金散。產難蓋因兒枕破與破血累其子故難產但服此藥還

其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末一錢

鹽鼓一兩以青布裹了燒紅急研細

右每服一錢用秤錘燒赤碎酒下

一方。治橫生先露手足

阿膠妙

滑石各一兩

冬葵子一合

即非橫生亦可服

此方簡當，便取其破血，又有濁陰下降之理，而摩法更妙。

右每服四錢，水煎連進二三服。一方有酥油二兩。

油蜜煎。治難產，瀝漿胞乾，胎不得下。

用香油、蜂蜜、小便各一碗，和勻銅鍋內，慢火煎一二錢，掠去沫，調白滑石末一兩，或益母草末，攪勻頓服。外以油蜂蜜於母腹臍上下摩之。或油煎一盞服之亦可。一方止用油。

蜜小便，能下難產。

更腦丸。一名催生丹。治難產及橫生逆產。

更腦。臘月者去皮，膜研如膏。

母丁香。二錢，為末。

麝香。一錢，另研細。

明乳香。二錢，半細研。

右研勻，用更腦髓和為丸，如雞頭大。陰乾，油紙封裹，每一丸破。

水後溫水下，即產。隨男左女右，手中握藥出。

更腦丸，其來尚矣。然男左女右，手握藥出，是未胎動，豈胞破後藥至而不然胞未破時藥入以能。

此內詢之高
明者

梓子引子。

治產難或橫或倒胎爛腹中服悶服之。

生柞木

一大握長一尺
洗淨寸剉生用

甘草

大者五寸
剉五段

右用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至
一升半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開豁
如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散。

黃蜀葵子不拘多少焙乾為末執酒調下二錢神效如無子
花亦可。若胎漏血乾難產痛極者并進三服良久腹中氣
寬胎滑即產須見正產候方可服之。如打撲死胎紅花酒
下。歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產
難時免得全家俱哭泣。

催生如意散。治橫生倒產。

人參

乳香各一錢

辰砂二錢一方只用五分

右為末。臨產時急用雞子清一個調藥末。再用薑汁調開。冷服。即時順產。子母無恙。

催生鉛丹。治橫逆難產。

用黑鉛一錢。將小銚子火上鎔化。投入水銀一錢。攪結成砂子。傾出。以熟絹衣角組成丸子。如菉豆大。臨產時麝香水吞下。二丸立下。

三退散。治橫逆難產。子死腹中。

蛇退一條

蟬退十四枚

人退即男子頭髮難蛋大一團

右俱燒灰。為末。分三服。酒調下。

此藥藥性
最輕試

有俱燒灰為末分三服酒調下

滑治散 催生神効

益元散 一兩

蛇退 一條燒灰存性

蟬退 生者五個燒灰

穿山甲 一片燒灰存性

男子亂髮 一團香油熬化

右為細末用壺水一碗和藥煎二沸入髮灰攪勻冷定服之立

下

一方治產不順 蛇脫一條 蚕退一張

右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性為末煎榆白皮湯調下一

錢三服覺痛便生

一方用蛇退一條全者燒灰八麝香一字酒調二錢面東服如

橫生逆產以餘渣塗所出手足即順也

神効乳砂丹 治難產

此忌用沙不
得也

明乳香爲末以猪心血爲丸如桐子大硃砂爲衣口乾每服
一丸嚥碎冷酒下良久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎
化服二丸良久未生再服

如胞漿乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱
湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前藥

如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或丁母散二服送下如胞
衣未下酒水服一丸卽下

產門不開用加味芎歸湯和服二丸

此藥靈驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三月
三日及月初上辰日亦可

一方乳香硃砂等分爲末麝香酒調下

一方乳香硃砂等分爲末麝香酒調下

又方。通明乳香一塊如皂子大爲末。腰痛時用冷水醋少許調服。扶立令兩手拿石燕子二個念醫靈藥聖遍行數步坐草便生更無痛楚。此法似迂用者云甚驗。

一方乳香研細五月五日滴水丸如雞頭大每服一粒無灰酒下名開骨膏。

一方用大硃砂於端午晒起以百日爲度研爲細末取臘月兔腦髓丸如菰豆大欲產時粥飲下一丸良久便生其藥男左女右手中握出晒硃砂不得着雨。

如神散。催生累効靈驗於理固難通於事寔殊効。

用路上草鞋一雙取鼻梁上繩洗淨燒灰童便和酒調下三錢一名千里馬此藥委是神奇。

妙方

即免腦充意

奇方益以鎮
墜為主能產
能安信非虛
也

小品方 療橫生倒產手足先出

生。用麝刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當向順而

一方用鹽塗兒足底又可急搖灰之并以鹽摩產婦腹上即產
黃金散 治生產一二日難分娩者服之如神

真金箔大者五片小者七片以小磁鍾將水少許去紙入金
在內用指研勻後再添水至半鍾一面先令一人扶產婦虛
坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩上方并穴前藥
溫服其胎即下此催生聖藥如產月未足又能安之

勝金丹 治難產神効

取兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生薑汁一盞下之立產若

立產如產虛弱及主亦有冷疾者以艾葉湯動氣即於銀器內重湯煖

敗鬼毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一匙下之立產若

產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖
過後服

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子

十四粒
去殼

硃砂

雄黃各一錢半

蛇蛻

一尺燒
存性

先妙在椒湯
法

右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用林湯椒灑臍下次
安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛束之須臾生下急
取去藥一丸可用三次

如聖膏 治產難併治胞衣不下兼治死胎

此法用之不
驗則致

草麻子七粒去殼細研成膏塗腳心胞即下速洗去不則腸
出却用此膏塗頂上腸自縮入○一方草麻子百粒雄黃一
錢細研如上法塗之○一方草麻子三粒巴豆四粒各去殼

已見恐傷脾

以寒濕之亦
是一法然須
因人而施毋
妄試也

益母不惟催
生抑且心痛
有驗

人麝香研細貼在臍中歌曰三麻四粒脫衣裳研碎將來入

麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難橫逆惡候死胎不下並治神驗

寒石 四兩內二兩生
二兩煨赤研細

硃砂

一石同研如深桃花色每用三分井華水調如薄糊以紙花剪如

一杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三上便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以乾

者一大把水七合煎服

一方令產婦兩手各握石燕一枚須臾即下

一方雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一

一方桂心為末薑便酒調服一錢神効名救苦散

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下兒頭帶土而下

魚膠方當試
甚驗

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下兒頭帶土而下

一方臘月兔頭煨爲末葱白煎湯調服二錢立生

一方燒銅錢通紅放酒中飲之

一方皇子二枚研末酒調下

一方用魚膠一尺析瓦上煨灰陳醋調服立下

一方好墨新汲水濃磨服之墨水聚兒出

一方取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤納酒中飲之皆取法於快
速之義也

一方神麴末水服方寸十

一方赤小豆爲末東流水服方寸七

一方當歸水酒調一錢服良久再服

凡產婦寒性
不同胎氣各
異諸方種種
俱云神効然
用者必詳症
體選之方驗
不然也無益
無益

一方車軸脂吞大豆許兩丸

一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下

一方車前子爲末酒服二錢

一方取本夫褌帶五寸燒存性酒調服下

一方取槐樹東枝令產婦把之易產

一方用紫蘇煎湯調益元散服之即產

一方吞槐子十四粒即下

一方取槐子十四枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不生再服之水

服亦得

一方生薑汁生地黃汁各半升令煎熟頓服之

治交骨不開

治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生產

當歸

川芎

各一兩

敗龜板

一個

婦人頭髮

生長過者
握燒有性

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎死不下灼

龜板亦可

○治胎死腹中

烏金散

治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或房

室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經行先下惡

露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產母面赤舌青是其

候也面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或二

死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃

洗切焙

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芍藥

軍薑 去皮

粉草 各一兩

小黑豆 四兩

百草霜 五錢

右爲末。每用二錢。米醋半合許。沸湯六七分。浸起溫。服疑貳之際。且進佛手散酒。小合。二三服。深之。若未死。子母俱安。若胎已死。立便逐下的。知其胎死。進此藥後。更進香桂散。須臾如手推下。常用催生。更加好滑石末半兩。葵子五十粒。搥碎。黃柞葉七八皮。葱白二寸。順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便。柞葉行氣逐血。葱白內通陽氣。盛血行。卽產矣。

香桂散 下死胎

麝香

五分另研一方。用當門子一個。

官桂

三錢爲末一方。用桂枝二錢。

右和勻。作一服。溫童便酒。或葱湯調服。須臾如手推下。此方比之用水銀等。不損血氣。一方加白芷三錢。一方單用桂末。

一平胃散也
而用以下死
胎可見用法
之不窮如此
慈母行則死
胎自行更後
朴硝則無不
下矣妙妙

一錢童便調下名救苦散

平胃散 治死胎不下 指甲青舌青脰間口中作屎臭

蒼朮水州 陳皮 厚朴薑汁炒 甘草炙五分

右剉一劑酒煮各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸溫服其胎化血水下或只用朴硝半兩研細以童便調溫服

妙或用二錢以順流水調下

一方 治難娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三兩 當歸炒 滑石七錢

瞿麥 葵子炒 茯苓 粉草 黃芩各半兩

右為麝末每服四錢水煎服

千金神造湯 治動胎及產難子死腹中並難娠兩兒一死一生

服之今死者出生者安神驗

蟹瓜 一升

甘草 一兩

阿膠 三兩

東流取其順
下先煮取其
力全

右三味以東流水一斗先煮蟹瓜甘草得三升去滓次內膠令
烊頓服之不能分再服若人困切口內藥藥入即活煎藥作服

新散輕
時二七

向竈用葦薪煮之

一方治胎死腹中乾燥着背

葵子 一升

阿膠 二兩

要知葵子多
用方妙

右以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

一方治子死腹中可半生不下或半着脊骨坐草不產血氣上

盤母心面無顏色氣欲絕及治胞水早乾胎澁不下

猪脂 一觔

蜜 二升

淳酒 二升

本三味共煎至二升服分溫二服不能服者隨多少緩緩服之

右三味共煎至二升服分温二服不能服者隨多少緩緩服之

一方治胎死腹中或半產不下

官桂 五錢

牡丹皮

川芎

葵子 各一錢二分

右為細末每服三錢葱白湯下

半夏湯治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及

胞乾而不起產者

半夏 一兩

半

桂 去皮七錢半

大黃 五錢

桃仁 三十個去皮尖炒

右為細末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑三片不煎

服如未效次服下胎丸

下胎丸治產難胞衣不出橫倒者或見死腹中法氣欲絕者

半夏 生

白欬 各半兩

妙在生服四物

治肥胖瘵多
難產者妙

危症極矣必
黑鉛水銀方
妙然症少緩
者切不可用

治胎前產後

方名

三

右為細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下三三九續續加

至五七九一方下三十丸
漸加至五十丸

一方治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急妙

蛇退一條全者香
油燈上燒研麝香少許

右為末童便酒各半盞調下一服即生効

辟瘟奪命丹治臨產羈然氣癢目翻口噤面黑唇青沫出口中

子母俱損兩臉微紅子死母活

蛇退一條
權內煨蚕退燒二錢男子髮燒灰一錢乳香五分

黑鉛二錢半水銀七分半依前法作千里馬即路上夫脚舊草鞋一隻
取鞋鼻洗淨燒灰一錢

右為末以豬心血丸如桐子大金銀箔七片為衣每服二九

川侄流水灌下或入伏龍肝調下土著見頭戴出為妙

用至流水灌下。或人飲龍胆調下。土者見頭出為妙。

宣明礬砂散。治胎死腸中不下。

礬砂研細

當歸各一兩

右研極細。只分作二服。溫酒調下。如重車行五里不下。再服。

牛膝丸。下死胎。

紫金藤即紫木香

杜牛膝二兩 紫金藤

蜀葵根各七錢

當歸四錢

肉桂二錢

麝香五分

右為末。米糊為丸。如桐子大。硃砂為衣。每服五十丸。乳香湯送下。

一方。治產難數日。子死腹中。不出母氣欲絕。

瞿麥六兩

通草

桂心各三兩

牛膝

榆白皮

各四兩

右細切。用水九升。煮取三升。去渣分三服。頓飲即下。一方無。

天花粉亦能墜胎。

榆皮有天花粉四兩。大能墜胎。

亦可治鬼胎

以上二十餘方隨人取便用之

一字神散。治子死腹中胞衣不下胞破不生累有神驗。

鬼白不拘多少黃色者去毛研爲末以手指撚之如粉極細爲度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八分通口服立生如神。

治死胎雜方。用辰砂一兩以水熬數沸爲末取酒服之立出。

一方真珠二兩爲末酒調服盡立出。

一方葵子爲末酒服方寸七若口噤不開格口灌之藥下卽活。

一方鹿角屑一兩葱五莖豆豉半合水煎服。

一方鹿角燒灰存性爲末每服三錢溫酒調下。

一方水銀半兩桂末三錢溫酒調下粥飲亦得。

一方錫粉水銀各一錢炙肉丸如大豆大吞下立出。

一方錫粉水銀各一錢東肉丸如大豆大水吞下立出

一方用雞子黃一個生薑自然汁一合調勻頓服分晚後用薑薑子粥補之

一方瞿麥二兩剉碎水八盞煎二盞服未出再服

一方竈心黃土爲末酒調服二錢

一方鍋底墨酒調服

一方米麥赤小豆同煮濃汁服立出

一方紅花酒煮汁服二三盞

一方以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子自下

一方用雌雞糞二十一枚水二升五合下米作粥食卽下

一方用三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煮

產婦東向飲之立出

一方取夫尿二升煮令沸飲之

一方以黃牯生糞塗母腹上立中

一方以牛糞炒令大熱入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨之立下

一方用烏雞一隻去毛細切水煎三三升候湯通毛用衣帛蘸摩腹中胎自出

一方榆白皮煮汁服二升

一方治有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豆三升醋煮濃汁三升頓服

一方用瓜蒌根一味焙爲末每服二錢取順流水下

